CURSO ONLINE

Teoria Polivagal e EMDR

Professor André Monteiro, PhD

PAI e TPV - Similaridades

- ◆ Ambas abordagens são recorrem à neurociência
- ◆ Ambas reconhecem o impacto de experiências do passado no presente
- ◆ Ambas enfatizam o papel protetor do sistema nervoso, de preservação da sobrevivência
- ◆ Ambas sublinham aspectos adaptativos em detrimento da patologia
- ◆ Ambas destacam a base biológica e interpessoal das relações

Uma abordagem integrada

- ◆ TPV e EMDR oferecem enquadre referencial para compreendermos o papel do SN em direção à saúde e bem-estar.
- ◆ TPV focaliza os aspectos autonômicos do cérebro e o desenvolvimento da habilidade de interação e correção.
- ◆ O EMDR focaliza o armazenamento da memória e a capacidade de aprendizagem para atualizar informações congeladas no tempo (memórias dependentes de estado).
- ◆ Ambos modelos apresentam interface significativa, podendo o EMDR aproveitar dos conceitos da TVP, integrando-os ao PAI.
- ◆ **Anatomia do Sistema Nervoso**
- ◆ Cada indivíduo é uma unidade de sobrevivência e superação.

Tarefa 1. Sobreviver

- ◆ Prioridade do SN = busca por estados de segurança e seguridade

SNA inclui :

- ➔ Sistema Nervoso Simpático = mobilização, acelerador, ativação, movimento (luta/fuga)
- ➔ Sistema Nervoso Parassimpático subdivide-se em
 - Vagal ventral = repouso, digestão, recuperação de energias, janela de tolerância e engajamento social
 - Vagal dorsal = imobilização, colapso

Nervo vago

Vagus significa “andarilho”, aquele que vagueia, em latim

- ◆ 10º Nervo craniano, composto por 2 nervos (ventral e dorsal)
- ◆ Feixe complexo de nervos aferentes e eferentes
- ◆ Transporta informações sensoriais do corpo para o cérebro e comandos do cérebro para o corpo
- ◆ Inerva a face, olhos, ouvido interno, coração, pulmões e órgãos abdominais
- ◆ Faz a mediação das respostas do SNA

Teoria Polivagal

- ◆ Desenvolvida por Stephen Porges
- ◆ Descreve o papel do nervo vago na mediação das respostas automáticas do sistema nervoso (respostas autônomas, biológicas, que não requerem um comando consciente) reação a sinais de perigo/estresse/alarme ou de segurança/seguridade por meio do Sistema Nervoso Autônomo Simpático e do Sistema Nervoso Autônomo Parassimpático.
- ◆ As reações das pessoas encontram-se organizadas conforme uma hierarquia de circuitos, seguindo etapas evolutivas de reações de sobrevivência:
 - Circuito Vagal Ventral (parassimpático light) – interação social e busca de respostas pela negociação, comunicação verbal
 - Sistema Nervoso Simpático – reações mais de “cada um por si”, de fuga ou de luta
 - Sistema Nervoso Parassimpático – Circuito Vagal Dorsal – quando os anteriores falham = colapso.

Neurocepção

- ◆ Neurocepção – percepção sem consciência (Porges)
- ◆ Neurocepção está sempre escaneando 3 ambientes em busca por sinais de perigo e confirmação de segurança:
 - ➔ Por Dentro – ambiente interno: sede, fome, energia, dor, náusea, pensamentos, emoções, fantasias, desejos, sensações
 - ➔ Por Fora – ambiente externo: luz, cheiros, espaço, proximidades, sons
 - ➔ Entre nós – espaço interpessoal, prosódia, contato visual, expressões, maneirismos, tiques, tensão x relaxamento muscular, ação e reação
- ◆ Sem percepção consciente.

Neurocepção + segurança = Vagal Ventral, interação, conversa, curiosidade, exploração, descrição, reflexão, sedução, busca, aproximação

Neurocepção + perigo/alarme = defesas adaptativas – encerramento da manifestação Vagal Ventral

Freio vagal

- ◆ Freio vagal – é um mecanismo do nervo vago que influencia o débito cardíaco. Isso é feito através do engajamento e desengajamento do Sistema Nervoso Simpático.
- ◆ Sem o nervo vago o coração bateria perigosamente mais rápido.
- ◆ Freio medeia débito cardíaco em relação às demandas ambientais.
- ◆ Freio vagal eficiente suporta tom vagal elevado

Tônus ou Tom vagal

- ◆ Tom ou tônus vagal é termo empregado para descrever flexibilidade do nervo vago de ativar o freio. Tom vagal elevado está associado à saúde e bem-estar = freia quando precisa, afrouxa, equivalente físico de uma janela de tolerância.
- ◆ Tom vagal baixo está associado à patologia – baixa capacidade de ajuste
- ◆ O apego serve como base para desenvolver tom vagal por meio da correção mãe-criança.
- ◆ Tom construído por habilidades que empregam freio com eficiência, retirando-nos de estados defensivos de sobrevivência (ioga, respiração consciente, mindfulness, apoio, carinho, segurança, nutrição, sono).

- ◆ Tom vagal baixo pode resultar de:
 - ➔ Falta de correção adequada na infância – cuidadores traumatizados sem autorregulação
 - ➔ Saúde precária e nutrição deficiente
 - ➔ Baixa habilidade de autorregulação
 - ➔ Memórias armazenadas de modo mal-adaptativo referentes a experiências adversas de vida
- ◆ Devemos ter tom vagal suficiente para reprocessar memórias traumáticas com êxito.

Sistema de engajamento social

- ◆ O sistema de engajamento social representa uma linguagem biológica exclusiva ou código de apego e conexão em mamíferos.
- ◆ Um sistema complexo que recruta nervos múltiplos, sendo o vago apenas 1 deles.
- ◆ Esses nervos coordenam movimento e conexão entre ritmo cardíaco, expressões faciais e cabeça.
- ◆ Conexão face-coração .

- ◆ O desenvolvimento atípico deste sistema pode levar a dificuldades de relacionamento e regulação emocional.

- ◆ Conexão é um imperativo biológico (Porges)
- ◆ Sistema de engajamento social é fundamental no apego e na formação de vínculos sociais.
- ◆ Precisamos de segurança para estabelecer laços sociais
- ◆ Sem segurança não conseguimos manter proximidade.
- ◆ Todos os mamíferos apresentam dicas para regular interação social
- ◆ O Sistema de engajamento social é um amortecedor contra o estresse e as experiências adversas.

- ◆ O sistema de engajamento social serve como uma base para a resiliência.
- ◆ Fundamental para o andamento da terapia .

Teoria Polivagal

- ◆ TPV oferece um modelo para conceitualizar o funcionamento do Sistema Nervoso Autônomo através de 3 circuitos .
- ◆ A conceitualização por meio da estrutura da TPV oferece uma perspectiva neurobiológica para conceitualização e planejamento de tratamento.
- ◆ Os sintomas clínicos são expressões da biologia e disfunções da fisiologia.
- ◆ O SNA responde a processos ascendentes (corpo=>mente) e descendentes (mente=>corpo)

PAI

- ◆ PAI modelo do EMDR – intrínseco, físico e adaptativo.
- ◆ Integra experiências internas e externas, do passado, presente e futuro.
- ◆ As experiências são organizadas em memórias físicas.
- ◆ As memórias servem como base para a percepção, atitudes e comportamento, bem como conhecimento sobre si mesmo, o outro e o mundo.

- ◆ As memórias organizam-se em redes

PAI e Teoria Polivagal

- ◆ Memórias não são pensadas apenas, são vividas.
- ◆ EMDR é terapia baseada no reprocessamento de memórias .
- ◆ Observamos os estados atuais ativados por memórias do passado.
- ◆ Memórias armazenadas inadequadamente resultam na ativação de respostas ao estresse por meio de ativação do SNA.
- ◆ Passado não reprocessado adequadamente interfere no presente, princípio tanto da TPV quanto do PAI .

Pontos chaves

- ➔ As memórias ativam respostas do SNA
- ➔ Funcionamento do SNA desempenha papel significativo no armazenamento de memórias.
- ➔ Flexibilidade do freio vagal é necessária para reprocessar memórias armazenadas de forma inadequada. Auxilia indivíduo a permanecer em sua janela de tolerância.

Modelo integrado de conceitualização

O terapeuta deve avaliar:

◆ Estado do SNA

➔ Quão saudável/flexível é o sistema nervoso do cliente?

➔ De que modo empregam freio vagal?

◆ PAI

➔ Como está o acesso às redes adaptativas e não-adaptativas?

◆ Interseção

➔ Como o funcionamento do SNA e do PAI relacionam-se com a apresentação dos sintomas e demandas do cliente?

1

SNA resiliente e memórias integradas

2

SNA resiliente, mas memórias mal-adaptativas

3

SNA comprometido, memórias integradas

4

SNA comprometido, memórias mal-adaptativas prevalecendo

Exercícios neurais de regulação (Porges)

- ◆ Experiências adversas perturbam nossa capacidade de desenvolver caminhos neurais adaptativos para saúde, bem-estar e resiliência.
- ◆ Essas experiências podem nos deixar sem uma base neural para gerenciar estresse.
- ◆ Nós nos esforçamos para empregar o freio vagal.
- ◆ Desenvolvemos caminhos adaptativos através da experiência de segurança, brincadeiras, comportamentos saudáveis, co-reguladores de apoio, aprendendo a aplicar o freio vagal e praticar a interação social saudável.
- ◆ As intervenções clínicas devem apoiar o desenvolvimento das vias neurais necessárias para a resiliência e o reprocessamento de memórias mal-adaptativas.
- ◆ Não se pode reprocessar memórias sem esses caminhos neurais.

Objetivos principais do tratamento

- ◆ A relação terapêutica oferece oportunidades para exercícios neurais que apoiem a regulação e a integração.
- ◆ 5 objetivos de tratamento do tratamento integrado TPV e EMDR:

1

Seguro o suficiente para sentir

2

Sentir e flexionar

3

Observar e nomear

4

Integrar experiências

5

Repetir

- ◆ Os três primeiros desses objetivos nos permitem confiar no processo.

4 ingredientes principais

Contexto

Escolha

Conexão

Sinais de segurança

As 8 fases do EMDR

- 1) Histórico e plano de tratamento
- 2) Preparação
- 3) Avaliação
- 4) Dessensibilização
- 5) Instalação da crença positiva
- 6) Escaneamento corporal
- 7) Encerramento
- 8) Reavaliação

Fase 1 Histórico e plano de tratamento

- ◆ Desenvolver a conceitualização do caso e os objetivos do tratamento.
- ◆ Estrutura TVP: A Fase 1 cria o espaço "seguro o suficiente para sentir", construindo o contêiner para fazer o trabalho.
 - ➔ Relacionamento terapêutico e segurança é o número 1
- ◆ Sintonize alvos potenciais e questões a serem abordadas em um plano de tratamento abrangente ou focado em sintomas.
- ◆ Qual sistema tem precedência?
- ◆ Começando com SNA ou memórias?
- ◆ Conceitualize através das lentes da TPV.
- ◆ Preparando o cenário para o trabalho.

Presença terapêutica

Segurança é a intervenção

- ◆ O fator MAIS importante para a cura.
- ◆ Requer que o terapeuta use todo o seu ser para estar totalmente presente e sintonizado.
- ◆ Facilita sentimentos de segurança e seguridade.
- ◆ Aqui, agora... física, emocional, cognitiva e relacionalmente.
- ◆ Isso requer que o terapeuta esteja aterrado, presente, regulado, em contato com seu próprio processo e também com o do cliente.
- ◆ Mostrar-se a partir de um lugar de humildade e empatia.
- ◆ Influencia a neurocepção e envolve o sistema de engajamento social no processo de cura.

- ◆ Não compareça à terapia fora de sua janela de tolerância.
- ◆ Dicas de presença:
 - ➡ Expressão facial que comunica conexão;
 - ➡ Entonação;
 - ➡ Postura física;
 - ➡ Linguagem corporal
- ◆ Use seu Complexo Vagal Ventral e Sistema de Engajamento Social como intervenções terapêuticas.
- ◆ Esteja ciente da neurocepção e envolva-a no trabalho.
“Quando olha à volta, como percebe seu nível de seguridade – de zero a 10?”
- ◆ Quando cliente se sente seguro, aprendizado e cura são possíveis.
- ◆ Isso é mais importante do que a técnica ou a intervenção real. A presença terapêutica pode ser entendida como **A técnica**.
- ◆ A consistência na presença permite que o cliente experimente um estado previsível de segurança e correção.
- ◆ A consistência na presença permite que o cliente experimente uma sensação de segurança, esteja aberto ao trabalho, seja curioso e cresça.
- ◆ Não podemos esperar que os clientes se curem se não criarmos espaços seguros para a cura.

Sistema nervoso do Terapeuta constitui uma intervenção.

Fase 1 e TPV

- ◆ Considere a TPV na Fase 1 – Levantamento da história clínica.
- ◆ Foi estabelecido um relacionamento suficiente seguro para o levantamento da história?
- ◆ Falar sobre passado ativa as respostas do SNA
- ◆ Aplicar o freio vagal por meio de:
 - ➔ Presença participativa
 - ➔ Aplicar habilidades para trabalhar com ativação
 - ➔ Ensinar habilidades no início
 - ➔ Corregulação no momento

- ◆ Quão saudável está o sistema nervoso?
- ◆ Clientes com alto tônus vagal e recursos para aplicar o freio vagal podem iniciar rapidamente o reprocessamento EMDR por meio do protocolo padrão.
- ◆ Clientes com tônus vagal baixo e poucos recursos para aplicar o freio vagal precisarão passar um tempo na Fase 2 praticando exercícios neurais. Esses exercícios ajudam o cliente a aplicar o freio vagal.
- ◆ Sem a capacidade de aplicar o freio vagal, o reprocessamento pode ser desestabilizador e retraumatizante.

Consciência dual e TPV

- ◆ Consciência Dual = um pé no passado, um pé no presente.
- ◆ Pelas lentes da TPV, queremos um pé na resposta ao estresse, um pé no Complexo Vagal Ventral
- ◆ CVV deve estar presente e acessível.

Fase 1 - Plano de tratamento

Plano de Tratamento Abrangente

- ◆ O terapeuta pode criar um Plano de Tratamento abrangente, caso o cliente tenha acesso flexível ao CVV.
- ◆ Flutuar de volta ao passado requer consciência dual.
- ◆ Deve sentir-se seguro o suficiente para sentir
- ◆ Deve ser capaz de perceber e nomear o que sente
- ◆ Deve ter algumas habilidades para sentir e flexibilizar de um estado para outro.

Plano de tratamento focado no sintoma

- ◆ Pode ser indicado quando há alguma estabilidade no sistema nervoso, mas não suficiente para o protocolo completo.
- ◆ O cliente precisa estar seguro o suficiente para sentir e ter algumas habilidades para flexibilizar.
- ◆ A correção deve ser amparada para viabilizar essas intervenções: CIPOS, Flash, EMD, Pendulação

Fase 2 - Preparação

- ◆ Construir resiliência do sistema nervoso, preparando-o para reprocessar memórias.

- ◆ Através das lentes da TPV, esta fase oferece:
 - ➔ Oportunidades de sentir-se no contexto de um relacionamento seguro.
 - ➔ Apoia o desenvolvimento do freio vagal e a flexibilidade do sistema nervoso.
 - ➔ Desenvolve a resiliência do SNA por meio de exercícios neurais.
 - ➔ Seguro o suficiente para sentir
 - ➔ Sentir e flexionar
 - ➔ Observar e nomear
 - ➔ Confie no processo

- ◆ Desenvolva habilidades para "mudança de estado" por meio de exercícios neurais.
 - ➔ A mudança de estado pelas lentes da TPV é a capacidade de aplicar o freio vagal e regular as respostas ao estresse.
 - ➔ Isso requer uma avaliação precisa da seguridade atual.
 - ➔ O processamento de memórias mal-adaptativas requer a capacidade de aplicar o freio vagal por meio de autorregulação e correção.

- ◆ Praticar exercícios neurais dentro do contexto da relação terapêutica e do espaço.

- ◆ Aprende-se a confiar no processo por meio de exercícios neurais que produzam resultados consistentes e confiáveis em na fisiologia.

Exercícios Neurais

◆ Integre teorias e técnicas

Respiração

Yoga

Mindfulness

Estado seguro, feixe de luz, DIR

Arteterapia

Música

Animais

Grupos de apoio

Terapias somáticas

Biofeedback

Fase 2 e Presença Terapêutica

- ◆ A correção abre caminho para a autorregulação.
- ◆ Sistema nervoso regulado e resiliente serve como substituto para o próprio processo de aprendizagem de seu cliente.
- ◆ Quão bom você é em regular os outros?
- ◆ Como faz isso?
 - ➔ Confiabilidade
 - ➔ Consistência
 - ➔ Atitude não-defensiva
 - ➔ Humildade

Fase 3 - Avaliação

- ◆ Identificação de alvos.
- ◆ Esta fase elicia respostas específicas de estado do SNA através do portal da memória-alvo.
- ◆ O implícito torna-se explícito.
- ◆ Pedimos a nossos clientes que acessem e sintam a memória. Isso requer:
 - ➡ A sensação de estar seguro o suficiente para sentir
 - ➡ A capacidade de sentir e flexionar (mudar de estado)
 - ➡ A capacidade de perceber e nomear
- ◆ A culminação desses 3 processos nos permite “confiar no processo”.
- ◆ Monitore a consciência dual ao concluir esta Fase
- ◆ Imagem
 - ➡ Portal sensorial para obter o sentido geral (felt sense) do SNA
 - ➡ Pode-se recorrer ao som, cheiro ou textura
- ◆ Crença negativa
 - ➡ Narrativa do SNA de como a memória encontra-se armazenada em
 - ➡ Aprendizagem específica de estado
 - ➡ A expressão cognitiva do felt sense do SNA
 - ➡ Tornando sentido implícito em narrativa explícita

◆ Crença positiva

➡ Narrativa do CVV

◆ VOC

➡ Escala em linguagem explícita

◆ Emoções

➡ Perceber explicitamente e nomear a experiência implícita do SNA

◆ SUDS

➡ Escala explícita da experiência implícita

◆ Corpo

➡ Notar e nomear o felt sense implícito do SNA

Fase 4 - Dessensibilização

- ◆ Iniciamos a dessensibilização da memória-alvo, por meio do uso dos EBL.
- ◆ Monitore a consciência dual e a conexão com o CVV durante todo o processo. Se um cliente perde o freio vagal, ele está revivendo a memória de uma resposta defensiva. Isso não proporciona suporte à integração da memória.
- ◆ Conferir regularmente se cliente quer prosseguir ou fazer uma pausa/parar oferece oportunidades de perceber, nomear e conectar-se ao presente, com auxílio da relação terapêutica. Cliente dá-se conta de que terapeuta se importa com seu ritmo e capacidade integrativa.
- ◆ Oferecer oportunidades para o cliente praticar exercícios neurais, sentir e flexibilizar enquanto integra a memória armazenada de forma mais adaptativa.
 - ➔ Isso acontece com contexto, escolhas, sinais de segurança e conexão.
 - ➔ Entrelaçamentos e emprego do freio vagal.
- ◆ Oferecer opções de checagem:
 - ➔ O que observa?
 - ➔ Você consegue continuar? Aceitar isso?
 - ➔ Incentivar a respiração
 - ➔ Incentivar ajustes
 - ➔ Checagem dos EBL- prossegue assim ou modifica?

Presença terapêutica

- ◆ Terapeuta permanece um corregulador ativo, não um espectador passivo.
- ◆ Use seu CVV para apoiar clientes a manterem um pé no CVV deles, por meio de seu sistema de engajamento social.
- ◆ Proporcione sinais de sua presença: Prosódia, tons suaves, contato visual.
- ◆ Transmita compaixão e cuidado através de seu sistema nervoso.
- ◆ Dê feedback e reforço, oferecendo contexto e conexão.
- ◆ Peça feedback ao cliente sobre como sente esses sinais; não suponha que você conhece os sinais do sistema nervoso do outro.

Fase 4 - Dessensibilização

- ◆ Aplicar intervenções para apoiar o sistema a manter um pé em CVV.
- ◆ Apoie capacidade do cliente de sentir e flexibilizar.
- ◆ Promova uma experiência integradora, pois o cliente está conectado com a segurança.
- ◆ Permita a integração da memória.
- ◆ Apoie o uso do freio vagal, conforme necessário.
- ◆ Os 4 ingredientes devem estar presentes: contexto, escolha, conexão e indícios de segurança.
- ◆ A presença terapêutica é um fator chave neste processo.

Entrelaçamentos

- ◆ Intervenções destinadas a trabalhar através de bloqueios, círculos ou ab-reações travadas.
- ◆ Um meio intencional para dar suporte a emperramentos no SNA ou a própria memória.

- ◆ Veja as ab-reações como defesas recrutadas ou bloqueadas, ativadas aqui e agora.
- ◆ Através do referencial da TPV, podemos entender entrelaçamentos como técnicas para apoiar como o SNA e PAI processam os dados sensoriais, pensamentos e sentimentos, conforme elas são mantidas nas redes de memória.
- ◆ Considere o papel de corregulador. Você está mantendo espaço com presença terapêutica?
- ◆ Neurocepção
 - ➡ Existem indícios suficientes de segurança e seguridade dentro, fora e entre?
- ◆ Avalie se o cliente ainda tem acesso a um estado misto ou se uma resposta de defesa foi totalmente recrutada.
 - ➡ Se o cliente não puder nomear ou descrever, isso pode ser uma indicação de que o VVC está offline.
- ◆ Alinhar entrelaça com neurobiologia.
- ◆ Criar oportunidades para tornar o implícito explícito por meio de nomeação e descrição.
- ◆ Oferecer ao cliente escolha dentro do contexto de segurança.
- ◆ Acionar o freio por meio de aterramento, respiração, pendulação, etc.

- ◆ Orientar a neurocepção para a realidade e segurança/seguridade atuais.
- ◆ Aumentar sinais de segurança/proteção.
- ◆ Oferecer a oportunidade de resposta ao estresse para descarregar ou concluir a ação.
- ◆ Oferecer a oportunidade de estar seguro o suficiente para sentir.
- ◆ Permitir que o cliente flexibilize entre estados fisiológicos.

Pontos emperrados

- ◆ Memórias alimentadoras:
 - ➡ Memórias anteriores na rede “alimentam” o alvo.
 - ➡ Memórias que foram disparadas e conectadas provocam respostas de estresse do SNA.
- ◆ Crenças particulares
 - ➡ Podem ser influenciadas pelo que nos foi dito ou ensinado.
 - ➡ Podem ser o resultado de estados crônicos de estresse do SNA e são a expressão cognitiva desses estados crônicos.
- ◆ Medos: indícios de perigo real ou mal-intepretados
 - ➡ A tentativa do SNA de proteger e criar estratégias contra perigos potenciais.

Fase 5 - Instalação

- ◆ Esta fase é necessária para a reestruturação cognitiva.
- ◆ "Ao se lembrar da experiência original, que crença positiva você tem sobre si mesmo agora?"
- ◆ Apoia integração da memória com redes de memória adaptativas.
- ◆ Pelas lentes da TPV, a CP é o resultado do reprocessamento e a nova história do CVV.
- ◆ A CP geralmente reflete resiliência, saúde e crescimento.
- ◆ Isso só pode ser verdadeiramente alcançado quando os circuitos de defesa não estiverem com recrutamento ativo.
- ◆ A narrativa explícita da sensação sentida de integração.
- ◆ À medida que a experiência é reprocessada, a narrativa expressa muda.
- ◆ Considere a CP como uma expressão cognitiva explícita da experiência resolvida de forma adaptativa.
- ◆ Uma oportunidade para verificar novamente o trabalho, pois a CP não se torna adaptativa ou instalada em um 7 se houver material restante para reprocessar.

Fase 6 - Escaneamento corporal

- ◆ Examinar o SNA em busca de qualquer resíduo que permaneça no senso sentido do corpo.
- ◆ Mantenha a experiência original junto com a CP e escaneie o corpo.
- ◆ Conceitualize isso como manter a memória original com a nova narrativa adaptativa do sistema nervoso e verificar se restam memórias implícitas.
 - ➔ Se a nova narrativa não é um reflexo verdadeiro da memória reprocessada conforme cliente a experimenta pelo SNA, o corpo o informará.
- ◆ Pode haver momentos em escanear o corpo aponta para outras memórias que impedem a resolução.

Fase 7 - Encerramento

- ◆ Sempre termine a sessão com ativação vagal ventral.
- ◆ Demore o tempo que for necessário para apoiar a "mudança de estado" do cliente, ou faça aterramento para obter vagal ventral.
- ◆ Pode levar algum tempo para se conseguir o freio vagal.
- ◆ O cliente pode ter as habilidades para aplicar o freio por conta própria, ou o terapeuta pode precisar atuar como corregulador.

- ◆ Não finalize a sessão em estado Simpático ou Vagal Dorsal.
 - ➔ O cliente pode estar em um estado misto, mas ventral precisa prevalecer.

- ◆ Seu cliente consegue autorregular-se de volta ao CVV.

- ◆ Seu cliente pode já estar em CVV, com base no reprocessamento e na resiliência de suas próprias

- ◆ Terapeuta pode precisar corrigir o cliente de volta ao CVV por:
 - ➔ Prover uma sensação de segurança e compaixão
 - ➔ Presença terapêutica
 - ➔ Exercícios neurais guiados para aplicar o freio vagal
 - ➔ Oferecer contexto, escolha, dicas de segurança e conexão

Fase 8 - Reavaliação

- ◆ Avaliar o progresso e o trabalho até o momento.

- ◆ Avaliar alterações no SNA.

- ◆ A partir do enquadre da TPV, constatamos redução das respostas de defesa que são ativadas fora de contexto.

- ◆ Como seu cliente tolerando o trabalho?

- ◆ Cliente consegue integrar material?

- ◆ Existe harmonia crescente entre as redes de memória e a ativação do SNA?
- ◆ Existe progressão de CVD para CVV, que ocorre através do circuito SNSimpático.
- ◆ Se o cliente relatar recaída de sintomas consistentes com o SNS, mas começou a processá-los no CVD, isso não é necessariamente um sinal “ruim”.
- ◆ O cliente mantém acesso ao CVV?
- ◆ EMDR não é um protocolo de terapia rígido. Depois de iniciar reprocessamento, encontramos ritmo.
- ◆ A cura acontece nos termos do cliente.
 - ➡ O que parece atraente para o sistema nervoso do cliente?
 - ➡ Sempre ofereça contexto e escolha.
 - ➡ É normal não dessensibilizar a cada sessão.
 - ➡ Encontramos um ritmo de trabalho considerando o PAI e o SNA.

Competência Cultural

- ◆ Racismo, preconceito e ódio são armazenados no sistema nervoso e nas redes de memória.
- ◆ As experiências informam a neurocepção e as respostas do SNA.
- ◆ Indicações de perigo e segurança podem diferir, dependendo das identidades e antecedentes culturais de cada um.
- ◆ Considere os papéis do trauma histórico e geracional no SNA e PAI.
- ◆ Qual é a predisposição biológica do cliente para CVV?
- ◆ A expressividade emocional é informada por valores culturais.
Valores culturais de independência versus interdependência variam, o que provavelmente influencia o desenvolvimento do sistema de engajamento social.
- ◆ Recursos culturais informam redes adaptativas e podem ensinar estratégias de regulação.
- ◆ Os valores culturais podem informar os exercícios neurais que aprendemos a praticar.
- ◆ Será que a Terapia EMDR e a TPV podem ser caminhos para trabalhar nossos próprios pontos de bloqueio no trabalho de diferenças culturais, discriminação, traumas históricos, práticas de agressão e exclusão?

Juntando tudo

- ◆ TPV e EMDR são abordagens complementares já integradas.
- ◆ Cabe aos terapeutas dar vida a esses modelos amparados pela neurociência no espaço de tratamento.
- ◆ Conceitualize seus casos através das lentes da TPV e PAI e reveja as intervenções ao longo do caminho.
- ◆ Concentre-se em dar passos pequenos de cada vez.

Resumindo

- ◆ **Mantenha-se fundamentado em seu próprio CW**
- ◆ **Mantenha-se curioso**
- ◆ **Mantenha-se humilde**
- ◆ **Mantenha-se presente**

Referências

Bergmann, U. (2020). Neurobiological foundations for EMDR practice. New York, NY: Springer Publishing Company.

Butler, E. A., Lee, T. L., & Gross, J. J. (2007). Emotion regulation and culture: Are the social consequences of emotion suppression culture-specific? *Emotion*, 7(1), 30-48. doi:10.1037/1528-3542.7.1.30

Carnevali, L., & Sgoifo, A. (2014). Vagal modulation of resting heart rate in rats: The role of stress, psychosocial factors, and physical exercise. *Frontiers in Physiology*, 5. doi:10.3389/fphys.2014.00118

Dana, D. (2019). *The polyvagal theory in therapy: Engaging the rhythm of regulation*. London: W W Norton and Company.

Geller, S. M., & Porges, S. W. (2014). Therapeutic presence: Neurophysiological mechanisms mediating feeling safe in therapeutic relationships. *Journal of Psychotherapy Integration*, 24(3), 178-192.

Kiernan, J. A., Rajakumar, N., & Barr, M. L. (2013). *Barrs the human nervous system: An anatomical viewpoint*. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

Kolk, B. V. (2015). *BODY KEEPS THE SCORE BRAIN, MIND*. LONDON: PENGUIN Books.

Porges, S. W. (2011). *The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation*. New York: W.W. Norton.

Shapiro, F. (2018). *Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy: Basic principles, protocols, and procedures*. New York, London: The Guilford Press.

/espacodamente

@espaco_da_mente

(61) 99182-6067

contato@espacodamente.com